




# PROGRAMA DE GESTION DEL DOLOR POSTOPERATORIO

## NEUROCIROLOGIA: PROTOCOLO DE ANALGESIA POSTOPERATORIA

Elección del protocolo por parte del anestesiólogo de quirófano



**SOS**

*El tratamiento con Dexketoprofeno ev no ha de superar las 48 h, y se administrará en 50 ml de S.F. en 15 min.  
Si ha de continuar el tratamiento con AINEs y tolera ingesta oral se administrará ibuprofeno 600 mg/6 h/vo<sup>1</sup>*

### EVALUACION DEL DOLOR (EVA) CADA 6 HORAS



**Rescate analgésico, si EVA > 3 (o escala categórica ≥ 2)**

**Morfina 0,05 - 0,1 mg / kg sc**

Reevaluar dolor tras 45 min, si continua EVA > 3: Consulta a médico responsable del paciente o S Anestesiología: busca 423(8-15h) ó 412(15-8h)

(1) En caso de ulcus péptico o alergia a Dexketoprofeno: Metamizol 2 gr / 6 h ev/vo

El tratamiento de las náuseas y vómitos se realizará con Ondansetrón 4 mg / 8 h ev

*En craneotomías se administrará de forma pautada 4 mg/8 h ev*

Fin evaluación del dolor, tras 2 EVAs < 3, sin administrar analgésicos