

Hipoglucèmia greu

Administració de Glucagó

Si vostè és diabètic pot patir una hipoglucèmia greu (baixada brusca de la quantitat de sucre) **amb pèrdua de consciència** per això és important que els seus familiars més pròxims o persones que viuen amb vostè coneguin la utilització i administració del GLUCAGÓ.

El glucagó és una hormona natural que té l'efecte contrari de la insulina en l'organisme i augmenta els nivells de sucre en la sang.

PAUTA A SEGUIR EN L'HIPOGLUCÈMIA GREU

CONSELLS PER ALS FAMILIARS


1. Verificar la pèrdua de consciència:

- BMT per sota de **60mg/dl**.



2. Buscar la caixa toronja guardada a la nevera (**GlucaGen Hypokit 1mg**).

3. Carregar el líquid en el vial, agitar suaument i quan estigui dissolt recuperar el líquid.(fig.1, 2, 3,)



4. Punxar a la zona de més fàcil accés: abdomen, cama , braç (fig.4).

5. En recuperar la consciència:

- Ha de prendre $\frac{1}{2}$ vas de suc i un tros de pa.



SI NO RECUPERA LA CONSCIÈNCIA TRUCAR AL 061

IMPORTANT:

- Tingui sempre a casa injectables de glucagó a la nevera i en els llocs on tingui risc de patir hipoglucèmia.
- És important revisar cada cert temps la data de caducitat de les ampolles